

Rosaceae – růžovité

Jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia* L.)

Strom, 5 – 12 (–15) m vysoký. Listy lichozpeřené, lístky 2,5 – 4,0 (–4,8) cm dlouhé, zuby lístků nejsou hnědavě žláznaté, pupeny bělavě plstnaté nebo olysalé, nelepivé, plody červené.

Rozšíření – Evropa, západní Sibiř, Malá Asie, zavlečen do USA, řazen mezi 250 nejinvasivnějších rostlin.

Květy – oboupohlavné, v chocholících, kalich a koruna pětičetné



květ



Listy – střídavé



Plody – malvice



malvice



řez malvicí



semeno



Formy:

S. aucuparia subsp. *aucuparia* – pupeny, rub listů a vřeteno listů plstnaté, malvice kulovitá



S. aucuparis subsp. *glabrata* (W. et Gr.) Cajander – jeřáb ptačí olýsalý – pupeny, rub listů a větveno listů olýsalé až skoro lysé, malvice elipsoidní (ČR – **Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník**)

`Edulis`; = *S. aucuparia* subsp. *moravica* (Zengerling) Á. et D. Löve - jedlé plody